

大信 技術情報

第114号

2012年10月発行

■発行所
大信産業株式会社
営業本部

■発行責任者
田中 公浩

せん さい 鮮 菜 く ん

液 肥

チツソ リンサン カリ
10 - 4 - 7

低コスト

特 長

N・P・Kのバランスの
とれた液肥で果菜類の
追肥やリン酸・カリ成
分の供給に最適です



「使用方法」

- (1) ハウス栽培の追肥に使用する時はかん水と同時に200倍以上にうすめた液体肥料をかけてください。
1回の施肥量は10アール当り10kg前後が最適です。追肥回数は10～20回です。
- (2) 露地栽培の追肥には100倍以上にうすめて使用してください。ただし、茎葉にかからないように施す場合には原液～数倍の希釈液の濃いものでもかまいません。
1回の施肥量は10アール当り10kg～20kg前後が最適です。追肥回数は10～20回です。
- (3) 苗床用としては200倍以上にうすめて数回に分施してください。
- (4) 葉面散布に使う時は200倍以上にうすめてください。
- (5) 農薬との混合は充分注意してください。

「使用上の注意」

石灰硫黄合剤と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用は行なわないでください。

シーアイマテックス株式会社



果樹・野菜の病害防除に **新戦力!**

農林水産省登録 第23103号

殺菌剤

ピリベンカール

顆粒水和剤

®はクミアイ化学工業(株)の登録商標



特長 ●有効成分：ピリベンカルブ 40.0% ●人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

- 新規系統ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
- 広範囲の病害に対して高い防除効果を示す総合殺菌剤です。
- 予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
- 各種作物への汚れや薬害発生リスクが少ない剤です。
- 葉の内部への進達性、茎部から上位葉への浸透移行性を有します。



適用病害と使用方法 ●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病 モモリア病、褐斑病 斑点落葉病 すす点病	3000～4000倍	200～700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回以内		3回以内
	黒点病、輪紋病 すす斑病	3000倍					
おうとう	灰星病、幼果菌核病						
な し	黒星病	3000～4000倍					
	黒斑病、輪紋病	3000倍					
ぶどう	灰色かび病	3000～4000倍		収穫14日前 まで			
	晩腐病						
も も ネクタリン	灰星病、黒星病 ホモフシス腐敗病	3000倍		収穫前日 まで			
	灰色かび病	3000～4000倍	収穫14日前 まで				
かんきつ	そうか病	2000～4000倍					
	黒点病	2000倍					
茶	炭疽病、輪紋病 新梢枯死症	3000倍	100～400ℓ /10a	摘採7日前 まで	1回		1回
豆 類 (種実、ただし、 だいず、らっかせい、 あずき、 いんげんまめを除く)	菌核病	2000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前 まで	3回以内	散 布	3回以内
あずき いんげんまめ	菌核病 灰色かび病、炭疽病						
だいず	菌核病	2000～4000倍					
	炭斑病						
きゅうり	灰色かび病、菌核病	2000～3000倍		収穫前日 まで			
トマト	灰色かび病						
ミニトマト	菌核病、葉かび病						
な す	灰色かび病、菌核病						
いちご	灰色かび病	2000倍	収穫14日前 まで				
キャベツ	菌核病						
レタス	灰色かび病、菌核病	2000～3000倍	収穫3日前 まで				
非結球レタス				収穫14日前 まで			
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病	2000～4000倍 2000～3000倍	100～200ℓ /10a	収穫前日 まで	5回以内		5回以内



日本曹達株式会社

稲刈り後の除草で翌年の準備を！

アロートS(粒剤)

農林水産省登録 第11912号



手軽、カンタンの粒剤タイプ！

使用量 10アール当り 4袋 (20kg)

雑草の多い場所への **スポット処理** もできます。

使用時期

水稻刈取後(秋期雑草生育期)
※早目の方が効果は期待できます。



適用雑草：一年生雑草・多年生イネ科雑草（スズメノテッポウ・イボクサ・アシカキ・スズメノカタビラ・ハコベ等）

- ★ 散布後の耕起は1か月間は空けて下さい。
- ★ 成分は土壤中で3か月位で分解、消失します。
- ★ 稲ワラの上からまいても効果バツグンですが水が溜まっている所では効果が半減します。
- ★ 石灰の入った土壌改良剤との近接散布は避けてください。

丸善薬品産業株式会社

畦畔の除草も忘れずに！

カンロン[®] 粒剤4.5

農林水産省登録 第14217号



- 長期間雑草を抑えます
- 粒剤なので散布がカンタンです
- 薬剤の流亡がなく、斜面でも安心です

有効雑草

- ・ 1年生雑草および多年生広葉雑草
- ・ 特によく効く雑草

スギナ・ヨモギ・ギシギシ・タンポポ・オオバコ・スズメノカタビラ
スズメノテッポウ・イボクサ・ツユクサ・ヤブカラシ・チドメクサ など

上手な使い方

- ・ 11月下旬～積雪までが適期です。
- ・ 土が乾燥していると効果が発揮できません。降雨の後をねらって散布して下さい。



アグロ カネショウ株式会社

軽々運べる電動アシスト付き手押し台車

でんどう ねこきち

電動猫吉

Dendou Nekokichi



① 電動アシストでつらい坂道も楽々


② パンクの心配なし！ノーパンクタイヤ採用

特長

③ ソフトスタート機能で荷崩れ防止

④ 下り坂も安心！ブレーキロック付き

手持ち時のバランス優先設計



当社オリジナル形状「ハートタイヤ」は2カ所で支える為、走行時の安定性に優れています。

■電動猫吉 Dendou Nekokichi 製品仕様

- モーター出力：ホイルインモーター 250W
- バッテリー容量：鉛酸バッテリー 24V / 12Ah
- バッテリー重量：9kg
- 充電時間：6～7時間
- 積載重量：120kg（平地）60kg（傾斜7°）
- 総重量：30kg
- 平地走行距離：約24km
※最大積載時平地走行4km/hで
- 荷台のサイズ：L910～1250mm×W570～870mm
- 引手高さ：キャスターの場合／低約650mm・中約750mm・高約840mm
スタンドの場合／低約480mm・中約590mm・高約680mm
- ブレーキ：ディスクブレーキ・ブレーキロック機構付
- 登坂能力：7°（傾斜での60kg積載時）
- フレーム材料：アルミ製
- 駆動方式：ソフトスタート機能付（急発進による荷崩れ防止）
- タイヤ：当社オリジナルノーパンクハートタイヤ（325-8）
250×4 ノーパンクタイヤ
- 梱包寸法：W970×D640×H550mm
- JANコード：4535601004417



かんきつへの保護力が自慢です。

- 製剤技術により、効果の持続力、耐雨性に優れます。
- 褐色腐敗病からチャノキイロアザミウマまで、幅広い病害虫に適用があります。
- 広範な作物に登録があり、みかん・かんきつ他、37作物で使用されています。


TM:ダウ・アグロサイエンス・エル・エル・シー商標

かんきつを黒点病やささまざまな病害から守る 園芸用殺菌剤

ジマンダイセン 水和剤



ダウ・ケミカル日本株式会社
ダウ・アグロサイエンス事業部門



黒点病防除期間は、前回散布後の積算降雨量が200～250mmに達したとき、または約30日後の再散布が目安です。



大信産業株式会社

本社 〒722-8507 尾道市山波町128の1 ☎(0848)46-0714
尾道営業所 〒722-8507 尾道市山波町128の1 ☎(0848)46-0726
福山営業所 〒721-0963 福山市南手城町4丁目15-7 ☎(084)922-3322
因島営業所 〒722-2102 因島市重井町5800-133 ☎(0845)24-3500
東広島営業所 〒739-0024 東広島市西条町御園字4441-1 ☎(082)423-2517
広島営業所 〒731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11の3 ☎(082)818-1450

庄原営業所 〒727-0004 庄原市新庄町270の6 ☎(0824)72-3028
今治営業所 〒794-0801 今治市東鳥生町1丁目6の41 ☎(0898)31-6770
緑化部東部営業所 〒722-8507 尾道市山波町128の1 ☎(0848)46-4193
緑化部西部営業所 〒731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11の3 ☎(082)810-5190
緑化部四国営業所 〒794-0801 今治市東鳥生町1丁目6の41 ☎(0898)31-6770
緑化部山陰出張所 〒690-0021 松江市矢田町139-2 ☎(0852)23-7666