

大信 技術情報

第122号

2015年5月発行

■発行所
大信産業株式会社
営業本部

■発行責任者
森本 彰

大間口

高軒高


高性能

強さと広さを兼ね備えた、
高性能パイプハウスの
決定版が登場!

新開発の
八角パイプ
を使用!

八角ワイドハウス

八角ワイドハウスの主な特長



特長

圧倒的な大空間!

1

新開発の八角パイプを用いることで
間口10.8m、軒高3.0mの
圧倒的な大空間を実現!



特長

高い強度。

2

耐雪50kg/m²
耐風速50m/secを
実現!

※軒高2.5mスパン0.9mの場合



農機具倉庫
としても
使えます。

大型出入り口
(3m高、3m巾)
取付可能

大きな農機具が
入ります。

パイプハウスで
鉄骨並みの
強さを実現!



八角ワイドハウスを形づくる 八角タフパイプ

八角ワイドハウスの主骨材には、断面が八角形の「八角タフパイプ」を使用。丸パイプ同士の点接点から面接点になることでパイプの結着力が大幅に強化されました!



パイプ同士の接点が
点から面へ

パイプ単体の強度

1.5倍

接点部の強度

1.2倍

6月試験ハウス施工 現地説明会開催予定

興味のある方は本社または各営業所にお問い合わせください。

渡辺パイプ株式会社

新登場

新規有効成分がダニをパワフルに撃退!!




殺ダニ剤

ダニコング[®] フォアフル

- 新しいタイプの殺ダニ剤 新規作用性を有し、既存殺ダニ剤抵抗性個体群にも有効です。
- 残効性に優れる 残効性に優れ、安定した防除効果が長期間持続します。
- 天敵・有用昆虫に優しい 天敵・有用昆虫を含む非標的昆虫・クモ類への安全性が高く、訪花性昆虫や天敵等の生物資材との併用にも適しています。




カンザワハダニ



ナミハダニ



ミカンハダニ



リンゴハダニ



〈写真はイメージです〉

適用作物(2015年3月現在)

茶

かんきつ

りんご

なし

ぶどう

もも

ネクタリン

かき

いちじく

おうとう

小粒核果類



殺ダニ剤

ダブルフェイス[®] フォアフル

- 新規殺ダニ成分でハダニ類に有効 新規作用性を有し、既存殺ダニ剤抵抗性個体群にも有効です。
- 微小ダニに優れた効果 新規成分ピフルブミドとフェンピロキシメートの混合剤で、ハダニと微小ダニの防除が可能です。
- 訪花昆虫に優しい ミツバチ、マルハナバチ等の訪花昆虫に影響が少ないため、開花時期でも安心して使用できます。

新規
有効成分

ピフルブミド

ハダニへの効果・残効性



フェンピロキシメート

ハダニ
微小ダニ(チャノホコリダニ・ミカンサビダニ)への効果

適用作物(2015年3月現在)

茶

かんきつ

なす

すいか

メロン

きゅうり

ピーマン

いちご

さやいんげん

あずき

花き類・観葉植物



〈写真はイメージです〉



日本農薬株式会社

東京都中央区京橋1丁目19番8号

ホームページアドレス <http://www.nichino.co.jp/>

柑橘生産者の皆様へ

「摘果作業の軽減に！」

ターム[®]
水溶剤

の上手な使い方



農林水産省登録
第22388号

① 温度の高い日に散布

最高気温が25～26℃以上になる日を選んで散布してください。
25℃以下では効果不足が懸念されます。
30℃以上では過摘果になる場合があります。
出来れば散布後2～3日程度、天候が良い日を選んでください。

② 湿度の高い日に散布

湿度が高いほど効果が高い傾向です。
成分は紫外線で分解しやすいので夕方散布がお勧めです。

③ 果実の大きさ

果実の大きさが親指大(20mm)以下の時に散布してください。
大きい果実は落ちにくい傾向です。

④ 樹勢の弱い樹には散布しない

新葉が少なく極端に樹勢の弱い樹に散布すると(旧葉が)落葉する場合があります(薬害)。

⑤ 混用は？

なるべく単用で散布してください。マシン油との近接・混用散布では、過摘果になる可能性があります。
(全摘果目的で使用する場合はマシン油と近接・混用します。)

⑥ 樹体への影響

タームを散布しても樹勢の低下は認められません。



アグロ カネショウ株式会社

粒剤を均一、
広幅に散布するなら

粒剤散布機BS-1



主な特長

- ◆粒状の土壌消毒剤や肥料を75cm幅で均一に散布できます。
- ◆28ℓ ホッパーで大量の粒剤を背負わず作業できます。
- ◆低い位置で散布するので、飛散が少なく、狙った位置へ散布可能。
- ◆本体重量が12Kgで、軽くて取り扱いやすい。



使用可能な農薬例

バスアミド、ネマトリンエース、
ネビリュウ、ネマキックなどの
粒剤散布に最適です



みのる産業株式会社

セルトレイ苗(土付き)を半自動でラクラク移植!

ブロッコリー・キャベツなど株間の広い作業に最適

みのる半自動移植機HPS-5

2015年8月
発売予定

主な特長


- ◆セルトレイで育てた土付き苗をカップへ1株ずつ投入して植付を行います。
- ◆植付部が横方向へ無段階で調節できるため、1条植え、往復2条植え、3・4条植えが可能です。
- ◆植付部は畝の高さに合わせて自動追従するので、植付が安定。
- ◆株間は、替えギヤーで幅広く設定できるので、様々な作物に対応できます。
- ◆作業速度は、低速と高速があり、圃場や作業者に合せて選べます。

適応野菜

ブロッコリー、カリフラワー、
ハクサイ、キャベツ、黒豆、
加工用レタス、タマネギ(爪交換)



みのる産業株式会社



黒点病防除期間は、前回散布後の積算降雨量が200~250mmに達したとき、または約30日後の再散布が目安です。

かんきつへの保護力が^{ジマン}自慢です。

- 製剤技術により、効果の持続力、耐雨性に優れます。
- 褐色腐敗病からチャノキイロアザミウマまで、幅広い病害虫に適用があります。
- 広範な作物に登録があり、みかん・かんきつ他、37作物で使用されています。

TM:ダウ・アグロサイエンス・エル・エル・シー商標

かんきつを黒点病やささまざまな病害から守る 園芸用殺菌剤

ジマンダイセン 水和剤



Dow AgroSciences

ダウ・ケミカル日本株式会社
ダウ・アグロサイエンス事業部門



大信産業株式会社

本社 〒722-8507 尾道市山波町128の1 ☎(0848)46-0714
尾道営業所 〒722-8507 尾道市山波町128の1 ☎(0848)46-0726
福山営業所 〒721-0963 福山市南手城町4丁目15-7 ☎(084)922-3322
因島営業所 〒722-2102 因島市重井町5800-133 ☎(0845)24-3500
東広島営業所 〒739-0024 東広島市西条町御園字4441-1 ☎(082)423-2517
広島営業所 〒731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11の3 ☎(082)818-1450
庄原営業所 〒727-0004 庄原市新庄町270の6 ☎(0824)72-3028

今治営業所 〒794-0801 今治市東鳥生町1丁目6の41 ☎(0898)31-6770
松江営業所 〒690-0011 松江市東津田町1866-1 ☎(0852)23-7666
緑化部 〒722-0212 尾道市美ノ郷町本郷1-3-6 ☎(0848)38-1193
緑化部広島営業所 〒731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11の3 ☎(082)810-5190
緑化部四国営業所 〒794-0801 今治市東鳥生町1丁目6の41 ☎(0898)31-6770
緑化部山陰出張所 〒690-0011 松江市東津田町1866-1 ☎(0852)23-7666