


大信 技術情報

第124号

2016年1月発行

■発行所
大信産業株式会社
営業本部

■発行責任者
森本 彰



あけましておめでとうございます

旧年中は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。さて、昨年は日本の農業にとりまして大きな出来事がありました。環太平洋連携協定（TPP）交渉が大筋合意され、農協法改正案も成立しました。いよいよ日本の農業は大改革の時を迎えました。しかし現状をみれば、農家の高齢化、担い手不足、耕作放棄地の増大、中山間地の過疎化等々厳しい状況にあります。現状をしっかりと把握し、関連者の力強い行動がなければこの隔たりは埋められません。私たちも微力ながら頑張って改革の手助けをいたします。

ところで農業は「命の産業」です。人間が生きるためには食糧が不可欠です。ミリグラムの種子がキログラムの食料を生産するのです。それも、空気と水と太陽という自然からの恵をいただいて、人間は命を継いでいるのです。私たちはその農業のお手伝いをさせていただいていることに誇りを持って、活動して参ります。

本年も引き続きご厚情賜りますようお願い申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。



大信産業株式会社

代表取締役社長
田中 康貴

野菜のチョウ目,アザミウマ類,アブラムシ類防除剤

デュポン™ **ベネビア[®] OD**

農林水産省登録：第23553号 有効成分：シアントラニリプロール…10.3%

powered by
CYAZYPYR[®]

**確かな防除で、納得の作物づくりへ。
食べる人の喜びこそ、すべて。**



特長
1

新規成分で幅広く害虫を防除

アザミウマ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類、キスジノミハムシ、チョウ目害虫に高い効果を示します。

特長
2

10～14日間の持続効果

10～14日の長期残効性で作物を健全に生育させ、より高い品質と収量が期待できます。

特長
3

天敵・訪花昆虫に対する高い安全性

ハチ類の導入も制限が少なく、IPMプログラムにも高い適合性があります。



アグロ カネショウ株式会社

水稻いもち病 新規薬剤

トライフロアブル[®]

農林水産省登録：第23263号 有効成分：テブフロキン…15.0%

●適用病害虫および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブフロキンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	1000倍	60～150L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
		8倍	0.8L/10a			無人ヘリコプターによる散布	


●1成分で“予防”と“治療”Wの効果

トライの有効成分テブフロキンの特長として、1成分で“予防”と“治療”の効果を併せ持つことがあげられます。テブフロキンは1成分のため特別栽培農産物における、有効成分数の節減にも最適です。

“1成分”で
予防効果 × 治療効果 **W** の効果

●いもち病に安定した効果

テブフロキンはいもち病菌に対して、感染を阻害するだけでなく、病斑形成や伸長、病斑上の胞子形成を強く阻害することにより、いもち病のまん延を防ぎます。また、葉面からの浸透性に優れ、高い速効性と耐雨性を示します。



●新規系統・新規作用性

テブフロキンは特徴的な構造をもち、既存の農薬とは異なる新規系統の化合物です。作用性に関して、テブフロキンはミトコンドリア電子伝達系の特異的な部位に作用していると考えられており、既存の各種いもち病防除剤とも交叉耐性を示さない新規作用性を有します。

明日をもっとすこやかに

meiji

Meiji Seika ファルマ

畦畔管理にお困りの方へ 芝の省力植栽技術！

シバ二重ネット工法

(ゴーローン)

○シバによる畦畔管理メリット

- ・ 草丈の低いシバを用いることで草刈りを減らせる
- ・ 足元が見やすく安全に草刈りができる
- ・ 見通しがよくなり、鳥獣被害を減らせる

○二重ネット工法(ゴーローン)の特徴

- ・ 農村に馴染みやすいシバを用いた畦畔管理
- ・ 急斜面(30~45°)でも少人数(5人程度)で簡単な植栽作業
- ・ 資材は木綿をはじめ天然分解性
- ・ シバには農林水産省品種登録の「朝駆」あさかけ「朝萌」あさもえ「ひめの」など



○シバ植栽の作業手順

時期	作業内容
～4月	前植生の除去 (野焼き、除草剤)
4～5月	床土入れ
6月	二重ネットの展開と 目土入れ



○二重ネットロール (50m巻き)

ロール直径:0.3m
長さ:1.2m
重さ:20kg

○ほぐし苗

メッシュ:1.0cm
新鮮重:200g/m²
苗の本数:400本/m²

果樹の糖度・着色アップ葉面散布剤

ハップル® 1 kg・6 kg

(2.1-2-4、苦土 4、高濃度ミネラル、メチオニン)

特
長


- ① 苦土と高濃度ミネラルの働きにより、光合成を促進します。
- ② メチオニンの働きにより、果実への糖等の転流を促進します。
- ※ ①、②の働きにより、糖度・着色アップを促進します。

使用
方法


- 着色始期から、300～500 倍で 3～10 日おきに 3 回以上散布してください。
- ・カンキツ: 蚬房期～
- ・スイカ: 開花後 20 日～
- ・トマト・ミニトマト: 果実肥大期～
- ・リンゴ・ブドウ・ナシ・メロン: 収穫 1 ヶ月前～
- ・モモ: 収穫 2 週間前～

ハップルの使用事例


山梨県 モモ(品種: 川中島)




熊本県 ミカン(品種: 宮川早生)



茨城県 ナシ(品種: 幸水)



長野県 リンゴ(品種: ふじ)



※使用事例のグラフは対照区を100とした指数で示しました。

※長崎・佐賀・熊本・広島のカンキツ産地にて、ご好評のもとご使用いただいています。

株式会社 生科研

かんきつへの保護力が自慢です。

- 製剤技術により、効果の持続力、耐雨性に優れます。
- 褐色腐敗病からチャノキイロアザミウマまで、幅広い病害虫に適用があります。
- 広範な作物に登録があり、みかん・かんきつ他、37作物で使用されています。

TM: ダウ・アグロサイエンス・エル・エル・シー商標

かんきつを黒点病やささまざまな病害から守る 園芸用殺菌剤

ジマンダイセン 水和剤



Dow AgroSciences

ダウ・ケミカル日本株式会社
ダウ・アグロサイエンス事業部門

黒点病防除期間は、前回散布後の積算降雨量が200～250mmに達したとき、または約30日後の再散布が目安です。



大信産業株式会社

本社 ☎722-8507 尾道市山波町128-1 ☎(0848)46-0714
尾道営業所 ☎722-8507 尾道市山波町128-1 ☎(0848)46-0726
福山営業所 ☎721-0963 福山市南手城町4丁目15-7 ☎(084)922-3322
因島営業所 ☎722-2102 因島市重井町5800-133 ☎(0845)24-3500
東広島営業所 ☎739-0024 東広島市西条町御園字4441-1 ☎(082)423-2517
広島営業所 ☎731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11-3 ☎(082)818-1450
庄原営業所 ☎727-0004 庄原市新庄町270-6 ☎(0824)72-3028

今治営業所 ☎794-0801 今治市東鳥生町1丁目6-41 ☎(0898)31-6770
松江営業所 ☎690-0011 松江市東津田町1866-1 ☎(0852)23-7666
緑化部 ☎722-0212 尾道市美ノ郷町本郷1-3-6 ☎(0848)38-1193
緑化部広島営業所 ☎731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11-3 ☎(082)810-5190
緑化部四国営業所 ☎794-0801 今治市東鳥生町1丁目6-41 ☎(0898)31-6770
緑化部山陰出張所 ☎690-0011 松江市東津田町1866-1 ☎(0852)23-7666