

大信 技術情報

第128号

2017年5月発行

■発行所
大信産業株式会社
営業本部

■発行責任者
森本 彰

新規除草剤☆あとから使える中期ジャンボ剤

アトカラ[®] ジャンボ[®] MX

- 農薬登録番号: 23866号
- 有効成分: アジメスルフロン 0.36%
ペノキスラム 0.36%
メソトリオン 2.0%
- 人畜毒性: 普通物

新提案！「中期にジャンボ」ラクラク散布！

湛水状態で、10a当り20個投げ込むだけの省力除草を実現します。
30アール程度までの田んぼなら、中に入らず畔から投げ込むだけでOK！
(必ず初期剤、一発剤との体系で使用して下さい。)

新技術！「ソニックスプレッド[®]テクノロジー」

だから拡散力が違う！

中期に散布することを想定して作られた中期専用のジャンボ剤です。

拡散スピードが速いので、稲が成長していても従来のジャンボ剤よりも
拡散不良が起きにくくなっています。

取りこぼした雑草を幅広く防除！

有効な3成分配合で、ノビエはもちろん、SU抵抗性雑草（コナギ、ホタルイ等）から、
クログワイ・オモダカ等の多年生雑草まで幅広い雑草に効果を示します。


上手な使い方

- ◆移植前後の初期剤、一発処理剤との体系で使用してください。



- ◆雑草の生育状況を見て、タイミングを逃さないように散布して下さい。

草種別散布適期	ホタルイ	ヘラオモダカ	ミズガヤツリ	ウリカワ
草丈5cmまで	3葉期まで	5葉期まで	3葉期まで	
クログワイ	オモダカ	ヒルムシロ	セリ	
草丈20cm	矢じり葉3葉期	発生盛期まで	再生期まで	



- ◆散布後、3～4日間は湛水状態を保つ！
7日間は落水、かけ流しはしない。
- ◆藻や浮草、稲ワラ等の残渣、田面の凹凸は、
拡散を妨げ、効果不足の原因となります。
- ◆水溶性フィルムなので濡れた手で触らない！
乾燥した場所で保管してください。

2016年11月現在

作物名	適用雑草名	使用期間	使用量	本剤の 使用回数	使用方法	アジメスルフロン を含む農薬の 総使用回数	ペノキスラム を含む農薬の 総使用回数	メソトリオン を含む農薬の 総使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ	移植後20日～ ノビエ3.5葉期 ただし、収穫45日前まで	小包装(パック) 20個(500g) /10a	1回	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる	1回	2回以内	2回以内

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。
- 容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。●防除日誌を記帳しましょう。



三井化学アグロ株式会社

追肥の回数を減らして楽々栽培 長期持続型肥料

らくまる

緩効性チッソほう素入り配合ペレット

チッソ 14 リンサン 10 カリ 10 ホウ素 0.2



1.施肥省力効果

施肥後、速やかに吸収される速効性と、土壌微生物で分解し徐々に効く緩効性とがバランス良く配合してあります。(肥効120日程度)


2.土壌微生物効果

連用することにより、土壌微生物を増殖し土壌病菌の活動を抑え連作を可能にします。

3.増収、糖度増加、酵素活性効果

有機態チッソとウレアホルムの相乗効果で、農作物の細根の発生を促進し、品質・食味を向上させます。

らくまる肥効曲線(模式図)



㊤ 中部飼料株式会社

環境に優しい園芸化成肥料

ジシアン化成

DdV580

15-8-10
Mg 2 B 0.3
正味 20kg

ジシアンジアミドの効果で肥効が持続！

硝酸化成抑制剤＝ジシアンジアミドを含有した園芸作物専用の化成肥料です。ジシアンジアミドの働きにより、流亡しやすい硝酸態窒素への移行をおだやかにさせ、窒素成分を無駄なく効率的に作物に効かせることができます。

微量元素 苦土(Mg) ホウ素(B)含有

V580 には園芸作物において、欠乏症が発生しやすい苦土・ホウ素も含有しておりますので、欠乏症を予防し作物の健全な生育・品質向上に役立ちます！特にホウ素欠乏症が発生しやすい、ブロッコリー・ハクサイ・キャベツ・ダイコン等のアブラナ科作物に対して優れた効果を発揮します。

園芸化成専用の V 型の成分バランス

N(窒素)15%－P(リン酸)8%－K(カリ)10%という成分バランスで、P成分が過剰な土壌でも使いやすい設計の肥料です。

施肥量の目安 (単位: kg)

作物	元肥	追肥
葉 菜 類	80～140	20～30
果 菜 類	40～120	20～30
根 菜 類	40～100	20～30

※施肥量に関してはあくまで目安ですので、生育環境などにより適宜加減してください。

 新東化学工業(株)

かんきつの初期害虫をまとめて退治！

キラップ®J 水和剤

農林水産省登録第 23245 号
有効成分：エチプロール 10.0%
シラフルオフェン 20.0%
人畜毒性：普通物（「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指すという通称）

K

特長

- 作用性の異なる殺虫剤の混合剤で、幅広い殺虫効果と感受性の低下した害虫に対して安定した効果を発揮します。
- かんきつ類の初期害虫であるチャノキイロアザミウマ、アブラムシ類、ケムシ類、その他の訪花害虫を同時に防除できます。



適用害虫の範囲及び使用方法（かんきつのみ抜粋）

（2017 年 4 月現在の登録）

作物名	適用害虫名	希釈倍数（倍）	10 アール当り使用液量（ℓ）	使用時期*	使用回数*	使用方法
かんきつ	チャノキイロアザミウマ	2,000	200～700	21 日	2 回 エチプロール 2 回 シラフルオフェン 2 回	散布
	アブラムシ類	～				
	ケムシ類	4,000				
	ケシキスイ類					
	ミカンバエ成虫	2,000				

*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫（摘採）前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。
※その他適用作物に茶があります。

■ご注意ください！

- かんきつの施設栽培及び着色始期以降での使用は、果実に薬害を生じるおそれがあるので、使用しないでください。
- かんきつのマシン油との混用は果実に薬害を生じるおそれがあるので、混用しないで下さい。


バイエルクロップサイエンス株式会社

いつものツライ作業が楽になる！腰部サポートウェア

rakunie
ラクニエ

人と地球のいのちを守る

MURITA
株式会社 モリタホールディングス



直立時

前屈時

前屈時のみ
サポート力を発揮

「楽」につながる
2つの筋肉を
サポート

仕様

サイズ	XS	S	M	L
身長 (cm)	148～157	157～166	166～175	175～184
胸囲 (cm)	72～101	72～101	76～106	80～111
カラー	ブラック			
素材	ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・ポリプロピレン・ポリアセタール			

■驚きの軽さ



約 250g

■着脱カンタン



約 30 秒

■サポート力が落ちない



5 万回の伸縮
約 90% の張力維持

■様々な職種・服装に対応



■手洗い OK



いろいろな作物の幅広い病害防除におすすめです！

シグナム® WDG

農薬登録番号：第22290号


有効成分：ピラクロストロビン 6.7%
ボスカリド 26.7%

BASF
We create chemistry

特
長

- 作用性の異なる剤を混合することで、うどんこ病、炭疽病、つる枯病、すすかび病、灰色かび病、菌核病、べと病など幅広い病害にすぐれた効果を示します。
- 両有効成分とも葉内に浸達するため残効性、耐雨性にすぐれます。
- 胞子発芽阻害にすぐれ、発病前から発病初期の予防的な散布ですぐれた効果を示します。

規格：100g・333g




作物名	適応病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用 時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピラクロストロビン を含む農薬の 総使用回数	ボスカリドを 含む農薬の 総使用回数
キャベツ	菌核病、株腐病	1500	100 ～ 300	収穫 7日前 まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内
	べと病	1500～2000						
はくさい	菌核病	1500		収穫 14日前 まで	3回以内		3回以内	3回以内
	白斑病、黒斑病 べと病、白さび病	1500～2000						
ブロッコリー	菌核病	1500		収穫 前日 まで	1回		1回	1回
	べと病	1500～2000						
トマト ミニトマト	葉かび病、灰色かび病 すすかび病 うどんこ病、菌核病	2000		収穫 前日 まで	2回以内		2回以内	3回以内
いちご	灰色かび病	1500～2000		収穫 7日前 まで	3回以内	5分間 セル苗浸漬 5分間 苗根部浸漬	4回以内 (定植前は1回以内 定植後は3回以内)	4回以内 (定植前は1回以内 定植後は3回以内)
	うどんこ病、炭疽病	2000						
たまねぎ	灰色腐敗病 灰色かび病、べと病 小菌核病	1500		定植 直前	1回			
	灰色腐敗病	500	-					

※この他に、なす・すいか・かぼちゃ・にんじん・にんにく・レタス・ピーマン・ししとうの登録があります。

詳しい登録内容についてはラベルをご確認ください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。●小児の手の届くところには置かないでください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。



黒点病防除期間は、前回散布後の積算降雨量が200～250mmに達したとき、または約30日後の再散布が目安です。

ジマン かんきつへの保護力が自慢です。

- 製剤技術により、効果の持続力、耐雨性に優れます。
- 褐色腐敗病からチャノキイロアザミウマまで、幅広い病害虫に適用があります。
- 広範な作物に登録があり、みかん・かんきつ他、37作物で使用されています。

TM:ダウ・アグロサイエンス・エル・エル・シー商標

かんきつを黒点病やさまざまな病害から守る **園芸用殺菌剤**

ジマンダイセン™ 水和剤



Dow AgroSciences

ダウ・ケミカル日本株式会社
ダウ・アグロサイエンス事業部門



大信産業株式会社

本社 〒722-8507 尾道市美ノ郷町本郷1-180 ☎(0848)38-2612
尾道営業所 〒722-8507 尾道市美ノ郷町本郷1-180 ☎(0848)38-2610
福山営業所 〒721-0963 福山市南手城町4丁目15-7 ☎(084)922-3322
因島営業所 〒722-2102 因島市重井町5800-133 ☎(0845)24-3500
東広島営業所 〒739-0024 東広島市西条町御園字4441-1 ☎(082)423-2517
広島営業所 〒731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11-3 ☎(082)818-1450
庄原営業所 〒727-0004 庄原市新庄町270-6 ☎(0824)72-3028

今治営業所 〒794-0801 今治市東鳥生町1丁目6-41 ☎(0898)31-6770
松江営業所 〒690-0011 松江市東津田町1866-1 ☎(0852)23-7666
緑化部 〒722-0212 尾道市美ノ郷町本郷1-36 ☎(0848)38-1193
緑化部広島営業所 〒731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11-3 ☎(082)810-5190
緑化部四国営業所 〒794-0801 今治市東鳥生町1丁目6-41 ☎(0898)31-6770
緑化部山陰出張所 〒690-0011 松江市東津田町1866-1 ☎(0852)23-7666