

軽量、省スペースなフロアブル製剤のセンチュウ剤

脱重たい
宣言!!
センチュウ防除
軽量化計画

ビーラム プライム フロアブル

■農林水産省登録:第24841号

- ☆ 軽量、省スペースなフロアブル製剤
- ☆ 臭気が少なく、取り扱いやすい
- ☆ 各センチュウ類に優れた効果を発揮



ビーラム® 粒剤 400kg (20袋) 自社土壌燻蒸剤
ティ・トラベックス® 油剤 458kg
(最低使用量 20ℓ/10a の場合 20 缶)



ビーラム® プライムフロアブル 5ℓ (1ℓ×5本)
《2haの圃場に使用する場合の例》

適用害虫および使用方法 2025年8月現在の登録内容 (一部抜粋)

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	使用 方法	本剤の 使用回数	フルオピラムを含む農薬の 総使用回数
ばれいしょ かんしょ	ネコブセンチュウ	400倍	100ℓ/10a	植付前	全面散布後 土壌混和	1回	1回
		200倍	50ℓ/10a				
さといも	ネグサレセンチュウ	400倍	100ℓ/10a	植付前			
		200倍	50ℓ/10a				
にんじん だいこん	ネコブセンチュウ	400倍	100ℓ/10a	は種前			
	ネグサレセンチュウ	200倍	50ℓ/10a				
ごぼう	ネコブセンチュウ	400倍	100ℓ/10a	は種前			
		200倍	50ℓ/10a				

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベル記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。



製品情報はこちら

バイエル クロップサイエンス株式会社

広範囲な畑地一年生雑草に有効!!

だいず、ばれいしょ、たまねぎの畑作用除草剤

モーティブ® 乳剤

■農林水産省登録:第23000号

- ◎ 2成分の成分配合で広範囲の畑地一年生雑草に有効
- ◎ 長期間にわたり効果が持続します
- ◎ シロザやツユクサなど問題雑草を抑えます

適用雑草と使用方法 2025年8月現在

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤 使用回数	使用 方法	ジメテナミド及び ジメテナミドPを含む 農薬の総使用回数	ベンティメタリンを含む 農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量				
かのこそう とうもろこし 飼料用とうもろこし	一年生 雑草	定植後(雑草発生前) 但し、収穫90日前まで	300mℓ/10a	100ℓ/10a	1回	全面 土壌 散布	1回	1回
		は種後~とうもろこし2葉期 (イネ科雑草2葉期まで)		100~150ℓ /10a				
		定植前(雑草発生前)	200~400mℓ /10a	100ℓ/10a				
たまねぎ		定植前(雑草発生前) 但し、定植45日後まで		100ℓ/10a				
ばれいしょ		植付後萌芽前(雑草発生前)		70~150ℓ /10a				
だいず、えだまめ		は種後出芽前(雑草発生前)	150~170mℓ /10a					



メシバ



スズメノカタビラ



イヌタデ



シロザ



コハコベ



BASFジャパン株式会社

凍霜害対策!! 花芽・花粉の保護に!

グリーンステム Greenstim



グリシンベタインの役割

- ①細胞内の溶質濃度を向上させ、耐寒性を向上
- ②細胞膜を保護し、脱水ストレスの緩和
- ③降霜ストレスで発生する毒物質(活性酸素)を除去



使用方法

対象作物	散布目的	散布時期	倍率	タンクℓ	グリーンステム
果樹全般	降霜による 花芽・花粉の保護	降霜のおそれがある 24時間～3日前頃	500倍	500ℓ	2袋
			1000倍		1袋

※樹木全体に散布! 乾いてしまえば、
降雨の影響はなく、残効が約2週間あります
(24時間で浸透しますので展着剤は不要です)

※高濃度散布が効果的です
※マシン油との混用可能です

降霜のおそれ あるって?


こんな時に注意! 凍霜害から果樹を守ろう!

- ①よく晴れて風と雲がない夜、午後8時の気温が5℃以下
- ②大潮(満月・新月)※霜注意報や天気予報もチェック!

事前散布が
効果的!

月の満ち欠けと 植物の関係

古来より、大潮(満月・新月)に植物の花芽や細胞が動きやすいと言われており
大潮に降霜すると、花芽の障害を受けやすいと考えられています。



☑ 使用上の注意

- 散布液がしたたる程度に作物全体に散布する。
- 農業あるいは他の液肥と混用する場合は予め少量を溶解して凝集、葉害などがいないか確認する。
- 葉害が出やすい農薬との混用は避ける。
- 生育ステージで限界温度が異なり、遭遇温度及び遭遇時間によっては効果が十分に発揮されない場合があります。

☑ 保管上の注意

- 室温で乾燥した場所に保管する。
- 吸湿性が高いので開封後は袋のチャックをしっかりと閉める。

輸入業者保証票

登録番号	輸第 100265号
肥料の種類	副産肥料
肥料の名称	Greenstim-N
保証成分量 (%)	窒素全量 11.0
正味重量	500g
輸入した年月	欄外に記載
輸入業者の氏名 又は名称及び住所	丸紅株式会社 東京都中央区日本橋二丁目7番1号



PHYTOCHROME INC.

トレハロース 50%配合。霜害・乾燥による萎れ対策に！

トレハロース入り
微量要素肥料

タキイトレエース

トレハロース
とは？

糖のひとつで自然界の動植物や微生物に多く含まれています。食料・医療品・化粧品等の幅広い分野で活用されています。農業分野では作物体内の水分保持、青果物の老化防止の効果が期待できます。



霜害対策


トレハロースを植物細胞中に供給することで氷点を降下させます。
また、トレハロースの氷結晶は表面が丸みを帯びており、細胞を傷つけにくく霜害の軽減が期待できます。

萎れ軽減

トレハロースの離水しにくい特徴を利用し蒸散を抑制させるとともに、乾燥後の植物細胞やタンパク質の状態を安定化させ、細胞破壊を最小限に抑えます。

《キャベツ育苗時の使用事例》

- ・処理区：500倍散布 × 2回
- ・対象区：散布なし
- ※育苗期間 30日目の画像



肥料成分 (単位%) ■肥料登録番号:生第93678号

水溶性りん酸	水溶性加里	水溶性苦土	水溶性マンガン	水溶性ほう素
3.0	2.0	1.5	1.0	0.5
鉄	銅	亜鉛	モリブデン	カルシウム(Ca)
0.221	0.011	0.053	0.015	3.08



タキイ種苗株式会社

タキイのタキイ

ドローン国家資格 講習申込受付中



中国マルチローター教習センターで
農業ドローン教習を受講いただいたお客様限定で
教習料金を割引させていただきます。

【こんなオペレーターにお勧め】

- ・趣味でカメラ付きドローンの目視外飛行を頻繁に行っている。
- ・国土交通省の目視外飛行の許可取得 (DIPS2.0) が面倒。
- ・将来的に空撮業務などの請け負いを考えている。 ...etc

JULCのアカウントを
作りませんか？
無料オンラインセミナーを
受講できます。
ご登録は無料です。



取得条件が厳しくなる前に！今がチャンスです！

お問い合わせ 大信産業(株) 営業推進部 Tel (0848) 38-2612 【担当:貞松まで】

(イーカカシ)

グリーン(株)の「e-kakashi」取り扱い始めました!

「データの見える化」だけで満足ですか?

e-kakashi は環境データを見える化するだけではありません。

目的に合わせたデータ処理・加工を自動で行い、
栽培ナビゲーションが「今、何をすべきか!」を提案します。



次号で具体的な導入事例をご紹介します。
右記 QR コードより、マンガで解りやすい説明もあります。



Greenin



TAISHIN SANGYO CO.,LTD.
大信産業株式会社

本社 〒722-8507 尾道市美ノ郷町本郷1-180 ☎(0848)38-2612
尾道営業所 〒722-0215 尾道市美ノ郷町三成1118-1 ☎(0848)38-2610
福山営業所 〒720-2412 福山市加茂町下加茂413-4 ☎(084)999-5888
因島出張所 〒722-2102 尾道市因島重井町5800-133 ☎(0845)24-3500
東広島営業所 〒739-0024 東広島市西条町御園4441-1 ☎(082)423-2517
広島営業所 〒731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11-3 ☎(082)818-1450

庄原営業所 〒727-0004 庄原市新庄町270-6 ☎(0824)72-3028
今治営業所 〒794-0826 今治市郷新屋敷町2-1-18 ☎(0898)31-6770
松江営業所 〒690-0046 松江市乃木福富町393-1 ☎(0852)23-7666
緑化部 〒722-0212 尾道市美ノ郷町本郷1-3-6 ☎(0848)38-1193
緑化部広島営業所 〒731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11-3 ☎(082)810-5190
緑化部四国営業所 〒794-0826 今治市郷新屋敷町2-1-18 ☎(0898)31-6770

■発行責任者 営業本部 森本 彰